

L'INALATORE

GENTILE PAZIENTE,

Il Suo medico le ha prescritto TRIXEO AEROSPHERE®.

Di seguito troverà una descrizione dettagliata della corretta modalità di utilizzo.



Prima del primo utilizzo, rimuovere il cappuccio dal boccaglio e agitare bene l'inalatore. Poi premere con decisione il centro dell'indicatore delle dosi fino a bloccare la cartuccia (non deve muoversi!) per rilasciare un'erogazione del medicamento.

Ripetere questi passaggi altre 3 volte. Ricordarsi di agitare bene l'inalatore prima di ogni erogazione. Dopo le 4 erogazioni di preparazione, la freccia deve indicare a destra di «120». L'inalatore è ora pronto per l'uso. Se l'inalatore non viene usato per più di 7 giorni, occorre prepararlo nuovamente rilasciando 2 erogazioni prima dell'uso.

INDICATORE DELLE DOSI

L'inalatore contiene un contatore, le dosi vengono contate a scalare:

La finestrella dell'indicatore delle dosi mostra le erogazioni di medicamento rimanenti nella cartuccia. Prima del primo utilizzo, l'indicatore delle dosi indica a destra di «120». Il numero rimanente di erogazioni è visibile sull'indicatore delle dosi.



Eseguire l'inspirazione dalla posizione eretta (cioè da seduti o in piedi).

1



Togliere il cappuccio e agitare bene l'inalatore prima dell'uso.

2



Tenere l'inalatore con il boccaglio rivolto verso di sé. Espirare completamente dalla bocca.

3



Serrare le labbra intorno al boccaglio e inclinare la testa all'indietro tenendo la lingua sotto il boccaglio.

4



Inspirando profondamente e lentamente, premere il centro dell'indicatore delle dosi fino a bloccare la cartuccia (non deve muoversi!) all'interno dell'inalatore e a rilasciare un'erogazione del medicamento.

5



Dopo aver inspirato, allontanare il boccaglio dalla bocca e trattenere il respiro il più a lungo possibile – fino a 10 secondi. Espirare lentamente e **ripetere i passaggi per la seconda erogazione.**

Dopo aver inspirato due erogazioni, rimettere il cappuccio al boccaglio.

Eseguire due erogazioni 2 volte al giorno.

TRIXEO AEROSPHERE® è destinato all'uso a lungo termine nel trattamento della BPCO. Non è indicato per il trattamento dei sintomi acuti e non sostituisce un inalatore ad azione rapida (medicamento di emergenza).

Non è destinato al trattamento dell'asma.

Per ulteriori informazioni, consigli e assistenza:

www.legapolmonare.ch/it/ malattie-e-conseguenze/bpco

Se ha altre domande sulla Sua malattia, si rivolga al Suo medico o al team dello studio medico.



PULIZIA

Pulire l'inalatore una volta alla settimana. È molto importante mantenere pulito l'inalatore, per evitare l'accumulo di residui di medicamento che potrebbero ostruire il boccaglio.



Estrarre il contenitore pressurizzato dall'inalatore.

Non pulire il contenitore pressurizzato né lasciare che si bagni.



Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio. Tenere l'inalatore sotto il rubinetto e far scorrere acqua calda attraverso di esso per ca. 30 secondi.



Girare l'inalatore e sottoporre alla stessa pulizia il boccaglio.



Scuotere via quanta più acqua possibile dall'inalatore. Lasciare asciugare l'inalatore all'aria durante la notte. **Non** inserire nell'inalatore il contenitore pressurizzato se l'inalatore è ancora bagnato.



Quando l'inalatore è asciutto, inserire **con cautela** il contenitore pressurizzato spingendolo nell'inalatore per evitare di rilasciare un'erogazione.



Scuoterlo energicamente per l'inalazione successiva. Premere due volte il centro dell'indicatore delle dosi per rilasciare un totale di 2 erogazioni in aria, lontano dal viso. L'inalatore è ora pronto per l'uso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non interrompa la Sua terapia con TRIXEO AEROSPHERE® senza consultare prima il suo medico o il suo farmacista.

Per ulteriori chiarimenti sull'uso di questo medicamento, si rivolga al suo medico o al suo farmacista. Troverà maggiori informazioni nel foglietto illustrativo, che Le consigliamo di leggere attentamente prima di usare il medicamento.

